

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата
ГЛИЦЕЛАКС

Регистрационный номер: P N002880/01

Торговое название препарата: Глицелакс

Международное непатентованное название: Глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

Состав на один суппозиторий

Активное вещество: Глицерол (глицерин) - 0,75 г или 1,5 г

Вспомогательные вещества - до получения суппозитория массой 1,4 г или 2,8 г:

Магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной) - 0,025 г или 0,05 г

Полисорбат-80 (твин-80) - 0,007 г или 0,014 г

Моноглицериды дистиллированные - 0,028 г или 0,056 г

Жир твердый - 0,59 г или 1,18 г

(Витепсол W35)

Описание Суппозитории белого со слегка желтоватым оттенком цвета, без запаха, гигроскопичные, торпедообразной формы. Допускается незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство.

Код АТХ A06AX01

Фармакологические свойства

Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку толстой кишки, рефлекторно стимулируя моторику кишечника. Размягчает каловые массы и облегчает их прохождение по толстой кишке.

Фармакокинетика

Глицерин быстро и почти полностью всасывается со слизистой оболочки прямой кишки.

Активно метаболизируется в печени. Является одним из субстратов для глюконеогенеза и повышает содержание глюкозы в плазме крови. С мочой в неизменном виде выделяется 7-14%.

Показания к применению

Препарат применяют при запоре различного происхождения, особенно при расстройствах акта дефекации и ректальном копростазе у лиц пожилого и старческого возраста.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, геморрой в стадии обострения, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки.

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности применение противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. В период грудного вскармливания применение возможно после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Вводить в прямую кишку по одному суппозиторию 1 раз в сутки.

Детям: с трехмесячного возраста и старше в дозе 0,75 г один раз в сутки.

Взрослым: в дозе 1,5 г 1 раз в сутки.

Не следует применять препарат более 7 дней без особых указаний врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи).

Особые указания

При длительном применении возможно прогрессирование нарушений физиологического процесса дефекации.

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. Не смазывать суппозитории минеральными жидкими и твердыми маслами.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и другими механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 0,75 г и 1,5 г

По 5 суппозиториев в контейнеры суппозиторные или в контурную ячейковую упаковку. Два контейнера суппозиторных или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 15 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"

125239, Москва, Фармацевтический проезд, 1

тел. (495)956-05-71, факс (495) 459-41-12

Схема извлечения суппозитория из упаковки

