

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению препарата  
**ГЛИЦЕЛАКС**

**Регистрационный номер:** P N002880/01

**Торговое название препарата:** Глицелакс

**Международное непатентованное название:** Глицерол

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав**

Состав на один суппозиторий

Активное вещество: Глицерол (глицерин) - 0,75 г

Вспомогательные вещества - до получения суппозитория массой 1,4 г

Магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной) - 0,025 г

Полисорбат-80 (твин-80) - 0,007 г

Моноглицериды дистиллированные - 0,028 г

Жир твердый - 0,59 г

(Витепсол W35)

**Описание**

Суппозитории белого со слегка желтоватым оттенком цвета, без запаха, гигроскопичные, торпедообразной формы. Допускается незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание поверхности суппозитория.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство.

**Код АТХ** A06AX01

**Фармакологические свойства**

Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку толстой кишки, рефлекторно стимулируя моторику кишечника. Размягчает каловые массы и облегчает их прохождение по толстой кишке.

**Фармакокинетика**

Глицерин быстро и почти полностью всасывается со слизистой оболочки прямой кишки. Активно метаболизируется в печени. Является одним из субстратов для глюконеогенеза и повышает содержание глюкозы в плазме крови. С мочой в неизменном виде выделяется 7-14%.

**Показания к применению**

Препарат применяют при запорах различного происхождения.

Эвакуаторные запоры у детей с 3-х месячного возраста.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, геморрой в стадии обострения, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки.

**С осторожностью**

Почечная недостаточность.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

При беременности применение противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. В период грудного вскармливания применение возможно после консультации с врачом.

**Способ применения и дозы**

Вводить в прямую кишку по одному суппозиторию 1 раз в сутки.

Детям: с трехмесячного возраста и старше в дозе 0,75 г один раз в сутки.

Не следует применять препарат более 7 дней без особых указаний врача.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи).

### **Особые указания**

При длительном применении возможно прогрессирование нарушений физиологического процесса дефекации.

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. Не смазывать суппозитории минеральными жидкими и твердыми маслами.

### **Влияние на способность к управлению транспортными средствами и другими механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 0,75 г и 1,5 г

По 5 суппозитория в контейнеры суппозиторные или в контурную ячейковую упаковку. Два контейнера суппозиторных или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 15 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности 2 года.**

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Производитель/организация, принимающая претензии:**

ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"

125239, Москва, Фармацевтический проезд, 1

тел. (495)956-05-71, факс (495) 459-41-12

### **Схема извлечения суппозитория из упаковки**

